



.....
Jméno a příjmení rodné číslo (číslo pojištění), pojišťovna
..... tel..... e-mail.....
bydliště

Vážená paní, vážený pane,

pokud s tím budete souhlasit, bude Vám podána očkovací látka proti nemoci COVID-19 Comirnaty/ SPIKEVAX
Posilovací/dodatečná dávka - může ji dostat pacient, **kteřý má dokončené základní očkovací schéma** takovými léčivými přípravky, které lze uznat za účelem vystavení certifikátu o provedeném očkování. Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy a jejího závažného průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí tak vyšší ochranu zdraví u rizikových osob.

Způsob aplikace očkovací látky:

Očkovací látka Vám bude podána injekčně do ramenního svalu. Používané injekce a způsob podání jsou obdobné jako u jiných druhů očkování.

Doba ochrany po očkování:

Jelikož délka ochrany po očkování se u každého člověka liší, nedokáže nikdo z nás s jistotou předvídat, jak dlouho je v co nejvyšší možné míře chráněn. Proto, jakmile je to pro danou skupinu osob možné, je využití přeočkování maximum, co můžeme proti nákaze covid-19 udělat.

Účinnost očkování:

Významný nárůst protilátek po podání posilovací dávky současně posílí i ochranu proti dosud známým novým variantám viru, například proti variantě delta. Stejně jako v případě jiných očkovacích látek, ani vakcína proti nemoci COVID-19 nemusí ochránit úplně všechny očkované.

Pro koho je očkování doporučeno:

Očkovat se mohou osoby po uplynutí doporučené doby od základního očkovacího schématu

Mírně zvýšená teplota nebo lehká infekce horních cest dýchacích, jako je nachlazení, nejsou důvodem k odložení očkování.

Kdy není vhodné očkování provádět:

Očkování se nedoporučuje také osobám, které v minulosti prodělaly závažnou alergickou (anafylaktickou) reakci.

V posledních 14. dnech jsem byl/a – nebyl/a **očkován/a; ženy – NEJSEM /MOHU BÝT** těhotná

Prodělal/a jsem: vážnou alergickou reakci: po jiném očkování (astmatický záchvat, dušnost, mdloby, nevolnost zvracení, vyrážka nebo otoky) ANO NE, po předchozím očkování proti COVID-19 ANO NE,

léčivý přípravek ANO NE, potraviny ANO NE, trpím jinou alergií doplňte.....

MÁM/NEMÁM oslabený imunitní systém v důsledku onemocnění nebo užíváte léky, které imunitní systém negativně ovlivňují – doplňte.....

MÁM/NEMÁM problémy s krvácením, snadno se Vám tvoří modřiny nebo užíváte léky, které omezují srážlivost krve – doplňte.....

MÁM /NEMÁM nyní akutní infekci, horečnaté, jiné závažné akutní onemocnění, prodělal/a jsem **onemocnění COVID-19** ANO před.....dny NE.

Datum základního očkování či předchozí posilují dávky COVID-19.....

Pokud máte po konzultaci se svým praktickým lékařem pochybnosti ohledně vhodnosti očkování kvůli Vaší specifické situaci (např. vzácné onemocnění, vzácná kombinace onemocnění nebo postižení atp.), neváhejte se poradit s Vaším odborným lékařem. O výše uvedeném informujte před očkováním očkujícího lékaře.

Doporučení konzultovat záměr očkování proti nemoci COVID-19 s lékařem vakcinačního centra, pokud:

- máte závažný zdravotní stav nebo jinou specifickou situaci, kterou jste před očkováním konzultoval s Vaším praktickým lékařem nebo s odborným lékařem
- jste měl/a problémy po podání předchozí dávky (očkovací látky proti onemocnění COVID-19), jako je např. alergická reakce nebo jiná závažná nežádoucí reakce.

Pokud máte jakékoli další otázky k očkovací látce nebo k očkování, zeptejte se očkujícího lékaře.

Bezpečnost podání očkovací látky a možné nežádoucí účinky očkování:

Žádná očkovací látka od žádného výrobce **neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19.**



Bezprostřední reakce po očkování:

Závažná alergická reakce po očkování (anafylaxe) je extrémně vzácná a může nastat po jakémkoli očkování. Někteří lidé mohou mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se může projevovat jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte lékaře vakcinačního centra. Bez včasné pomoci lékaře může dojít k újmě na zdraví, ve výjimečném případě může být pacient/ka také ohrožen/a na životě. Abyste tak mohl/a učinit, bude Vám doporučeno po očkování setrvat 15 minut na místě, kde se očkování provádí.

Pozdější reakce na očkování:

Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky. Pokud se vyskytnou, jsou zpravidla lehké a odezní během několika málo dní.

U více než jednoho očkovaného z deseti se může vyskytnout bolest nebo otok v místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů nebo kloubů, zimnice nebo horečka.

- u méně než jednoho očkovaného z deseti se může vyskytnout zarudnutí v místě vpichu injekce nebo pocit na zvracení.
- u méně než jednoho očkovaného ze sta se může vyskytnout zvětšení lymfatických uzlin nebo malátnost nebo jiné nežádoucí účinky.

Doporučení po očkování:

Bezprostředně po aplikaci očkovací látky: Po podání očkovací látky se doporučuje pečlivé sledování Vašeho zdravotního stavu. Vyvarujte se výraznější fyzické námahy dva dny po očkování.

Později po aplikaci očkovací látky:

V případě, že se po očkování u Vás vyskytne některý z nežádoucích účinků, informujte lékaře vakcinačního centra.

Prohlášení očkované osoby:

Prohlašuji, že:

- nemám žádné známky závažnějšího infekčního onemocnění (jako jsou kašel, rýma, horečka apod.),
- nevztahují se na mne žádná karanténní opatření ve vztahu k nemoci COVID-19,
- nevím o žádném jiném důvodu, který by bránil v podání očkovací látky (např. těhotenství),
- neměl jsem v minulosti závažnější alergickou reakci či závažnější krvácivé projevy.

Prohlašuji, že jsem byl/a srozumitelně informován/a o veškerých shora uvedených skutečnostech a měl/a jsem možnost klást doplňující otázky. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s aplikací očkovací látky.

Datum podpisu:.....

Podpis očkované osoby (zákonného zástupce):

Lékařská zpráva

Dg.Z258

Protokol o očkování proti onemocnění COVID-19

Vakcína: COVID-19 Comirnaty/ SPIKEVAX

Místo aplikace: nedominantní paže

Číslo šarže:**expirace**

Očkovaný/á obdržel informaci o očkování a očkovací látce a podepsal informovaný souhlas s očkováním.

Z anamnézy vyplývá, že je zdrav a nemá kontraindikace k očkování.

Byl poučen o výskytu možných nežádoucích reakcí po očkování a o nutnosti setrvat pod dohledem lékaře 15 minut po podání vakcíny z důvodu možné alergické reakce.

Doporučujeme 48 hod po očkování vynechat fyzickou zátěž, vyvarovat se nadměrnému slunění a požití alkoholu.

Při teplotě možno užít antipyretika (Paralen...).

V případě přetrvávající reakce po očkování kontaktujte svého praktického lékaře a o této reakci laskavě informujte pracovníky vakcinačního centra. Očkovaný/á souhlasí s termínem podání druhé dávky. V případě, že se očkovaný/á ze zdravotních důvodů nebude moci dostavit na očkování, kontaktuje vakcinační centrum.

Razítko a podpis očkujícího lékaře: